

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน
แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด



ข่วน



เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม

กลืนลำบากกลัวน้ำ

คันรุนแรง

บริเวณที่เคยถูกกัด

อัมพาตตาย

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- อสยเปลี่ยน ไม่รู้เรื่อง
- หงุดหงิด เกือบฉุน
- ขวอระแวง บ่นตายยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าเหอน

- น้ำลายไหล
- กางพ่อยดก
- ล้มลง ตาย

อย่าแหยม

อย่าเหยียบ

อย่าแยก

อย่าหยิบ

อย่ายุ่ง

คาถา
๕ย

กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เปล่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน

✗



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม เช่น
สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด



ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ด้วย "คาถา 5 ย."

1

อย่าแหย่

ให้สัตว์โมโห

เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้



2

อย่าเหยียบ

บริเวณลำตัว
ขา หรือหาง
ของสัตว์



3

อย่าแหยก

สัตว์ที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ

4

จานข้าวหรืออาหาร
ขณะที่สัตว์กำลังกิน



5

อย่ายุ่ง

กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย
เพื่อลดความเสี่ยง
การรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า





กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

โรคพิษสุนัขบ้า



ภัยใกล้ตัว จากสัตว์เลี้ยงแสนรัก

แค่ถูก กัด ข่วน เลีย ก็เสี่ยง ตาย ได้!

เลี้ยงอย่างถูกวิธี



พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 2 เดือน และฉีดซ้ำตามนัด

ลดจำนวนด้วยการทำหมัน



พาไปข้างนอก ควรใช้สายจูง

เมื่อโดน กัด ข่วน

1

ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆ ประมาณ 15 นาที

2

ใส่ยา

ทาแผลด้วยยาฆ่าเชื้อเบตาดีน

3

กักสุนัข

กักสัตว์เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน

4

หาหมอ

พบแพทย์ทันที และให้ประวัติการฉีดวัคซีน

5

ฉีดวัคซีนให้ครบ

ฉีดวัคซีนให้ครบและตรงตามนัดทุกครั้ง



☎ 1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโผ



www.naso.go.th



045-979-956



โรคพิษสุนัขบ้า



อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน



อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เบื่ออาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง



ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจล้มเหลว
หัวใจหยุดเต้น โคม่า
และเสียชีวิต



๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ



พาสัตว์เสี่ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้
ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด
รีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน



กองสาธารณสุขท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น